

悪性骨・軟部腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
IFO+ADR	イホマイド	1.5-3.0g/m ²	120分	day1-3	28日
	ドキシソルビシン	20-30mg/m ²	60分	day1-3	
wPTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	day1,8,15	28日
ADR	ドキシソルビシン	75mg/m ²	急速静注	day1	21日
エリブリン	エリブリン	1.4mg/m ²	急速静注	day1、8	21日
トラベクテジン	トラベクテジン	1.2mg/m ²	24時間	day1-4	21日

悪性黒色腫

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日
イピリムマブ	イピリムマブ	3mg/kg	90分	day1	21日
ペムブロリズマブ(3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日
IPI+Nivo	イピリムマブ	3mg/kg	90分	day1	21日
	ニボルマブ	80mg/body	30分	day1	
ペムブロリズマブ(6週毎)	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日
ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日

MSI-Higを有する固形腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ペムブロリズマブ(3週間)	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日
ペムブロリズマブ(6週間)	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日