

白血病

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
AML89 寛解導入	ダウノルビシン	40mg/m ²	60分	day1-4	28日
	シタラビン	80mg/m ²	24時間	day1-7	
	メルカプトプリン水和物	70mg/m ²	内服	day1-10	
AML89 地固め①	ダウノルビシン	50mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	80mg/m ²	24時間	day1-7	
	メルカプトプリン水和物	70mg/m ²	内服	day1-7	
AML89 地固め②	ミトキサントロン	7mg/m ²	60分	day1-3	28日
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	day1-5	
AML89 地固め③	エトボシド	100mg/m ²	180分	day1-5	28日
	シタラビン	80mg/m ²	24時間	day1-7	
	ビンデシン	2mg/m ²	30分	day10.12	
AML95 寛解導入	イダルビシン	12mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	100mg/m ²	24時間	day1-7	
AML95 地固め①	ミトキサントロン	7mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	day1-5	
AML95 地固め②	エノシタピン	200mg/m ²	180分	day1-7	28日
	ダウノルビシン	50mg/m ²	30分	day1-3	
	エトボシド	100mg/m ²	180分	day1-5	
	メルカプトプリン水和物	70mg/m ²	内服	day1-7	
AML95 地固め③	エノシタピン	200mg/m ²	180分	day1-7	28日
	アクラシノン	14mg/m ²	30分	day1-7	
AML95 維持強化①	エノシタピン	170mg/m ²	120分	day1-6	28日
	ダウノルビシン	30mg/m ²	30分	day1.4	
	メルカプトプリン水和物	70mg/m ²	内服	day1-6	
AML95 維持強化②	エノシタピン	170mg/m ²	120分	day1-6	28日
	ミトキサントロン	5mg/m ²	30分	day1-2	
AML95 維持強化③	エノシタピン	170mg/m ²	120分	day1-6	28日
	エトボシド	80mg/m ²	180分	day1.3.5	
	ビンデシン	2mg/m ² (max3mg/body)	30分	day1.8	
AML95 維持強化④	エノシタピン	170mg/m ²	120分	day1-6	28日
	アクラシノン	14mg/m ²	30分	day1-4	
AML95 維持強化⑤	エノシタピン	170mg/m ²	120分	day1-6	28日
	ダウノルビシン	30mg/m ²	30分	day1.4	
	メルカプトプリン水和物	70mg/m ²	内服	day1-6	
AML95 維持強化⑥	エノシタピン	170mg/m ²	120分	day1-6	28日
	エトボシド	80mg/m ²	180分	day1.3.5	
	ビンデシン	2mg/m ²	30分	day1.8	
APL97 寛解導入 (WBC \geq 10000/ μ l)	イダルビシン	12mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	100mg/m ²	24時間	day1-5	
	トレチノイン	45mg/m ²	内服	最大60日	
APL97 寛解導入 (3000 \leq WBC \leq 10000/ μ l)	イダルビシン	12mg/m ²	30分	day1-2	28日
	シタラビン	80mg/m ²	24時間	day1-5	
	トレチノイン	45mg/m ²	内服	最大60日	
APL97 地固め①	ミトキサントロン	7mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	day1-5	
APL97 地固め②	ダウノルビシン	50mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	140mg/m ²	24時間	day1-5	
	エトボシド	100mg/m ²	120分	day1-5	
APL97 地固め③	イダルビシン	12mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	140mg/m ²	24時間	day1-5	
APL97 維持強化	トレチノイン	45mg/m ²	内服	day1-15	28日
	メルカプトプリン水和物	90mg/m ²	内服	day1-15	
	メトレキサート	20mg/body	内服	day1.15	
AML201 寛解導入 IDA	イダルビシン	12mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	100mg/m ²	24時間	day1-7	
AML201 寛解導入 DNR	ダウノルビシン	50mg/m ²	30分	day1-5	28日
	シタラビン	100mg/m ²	24時間	day1-7	
AML201 地固め①	ミトキサントロン	7mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	day1-5	
AML201 地固め②	ダウノルビシン	50mg/m ²	30分	day1-3	28日
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	day1-5	
AML201 地固め③	アクラシノン	20mg/m ²	30分	day1-5	28日
	シタラビン	200mg/m ²	24時間	day1-5	

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
AML201 地固め④	エトポシド シタラビン ピンクリスチン ビンデシン	100mg/m2 200mg/m2 0.8mg/m2 2mg/m2	60分 24時間 30分 30分	day1-5 day1-5 day8 day10	28日
AML201 HiDAC	シタラビン	2000mg/m2 × 2回	180分	day1-5	28日
APL205R寛解導入 トリセノック	三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	120分	day1-25	28日
APL205R寛解導入 IDA追加用	イダルビシン	12mg/m2	30分	day1-2	28日
APL205R 地固め①	三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	120分	day1-25	28日
APL205R 地固め②	三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	120分	day1-25	28日
APL205R 地固め③ PBSCH	シタラビン G-CSF	4000mg/m2 10 μg/kg	180分 × 2回 皮下	day1-4 day6～採取日まで	-
APL205R PBSCT	ブスルファン メルファラン 幹細胞輸注 G-CSF	1mg/kg(60歳以上0.7mg/kg) 70mg/m2 5 μg/kg	内服 60分 皮下	day-6～-4 day-3～-2 day0 day3～	-
MEC	シタラビン エトポシド ミトキサントロン	100mg/m2 80mg/m2 5mg/m2	24時間 120分 30分	day1-7 day1-5 day1-3	28日
HAM	シタラビン ミトキサントロン	2g/m2 × 2回 10mg/m2	180分 × 2回 30分	d1-3 day3-5	28日
大量AraC療法	シタラビン	2g/m2 × 2回	180分 × 2回	day1-4	28日
ADVP	シクロホスファミド ドキシソルピシン ピンクリスチン L-アスバラギナーゼ ブレドニゾロン	600mg/m2 20mg/m2 1.3mg/m2(Max2mg/body) 6000UI/m2 40mg/m2	180分 60分 急速静注 120分 12時間	day1.(15).(22) day1.2.8.15.(22) day1.8.15.(22).(29) day22-31 day1-29 then taper	28日
ALL97 寛解導入	〈寛解導入〉 シクロホスファミド ダウノルビシン ピンクリスチン L-アスバラギナーゼ ブレドニゾロン	1200mg/m2 45mg/m2 1.3mg/m2(Max2mg/body) 3000UI/m2 60mg/body	180分 60分 急速静注 120分 6時間	day1 day1-3 day1.8.15.22 day9.11.13.16.18.20 day1-14 then taper	28日
ALL97 地固め①	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルピシン ブレドニゾロン	1.3mg/m2(Max2mg/body) 1000mg/m2 60mg/m2 60mg/m2	急速静注 180分 24時間 内服	day1 day1 day1 day1-3	28日
ALL97 地固め②	メトトレキサート	500mg/m2	24時間	day1	28日
ALL97 地固め③	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルピシン ブレドニゾロン	1.3mg/m2(Max2mg/body) 1000mg/m2 60mg/m2 60mg/m2	急速静注 180分 24時間 内服	day1 day1 day1 day1-3	28日
ALL97 地固め④	エトポシド シタラビン メルカプトプリン ブレドニゾロン	100mg/m2 200mg/m2 60mg/m2 60mg/m2	60分 24時間 内服 内服	day1-4 day1-4 day1-4 day1-4	28日
ALL97 地固め⑤	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルピシン デキサメタゾン	1.3mg/m2(Max2mg/body) 1000mg/m2 60mg/m2 10mg/m2	急速静注 180分 24時間 内服	day1 day1 day1 day1-3	28日
ALL97 地固め⑥	メトトレキサート ドキシソルピシン ピンクリスチン	500mg/m2 45mg/m2 1.3mg/m2(Max2mg/body)	24時間 60分 急速静注	day1 day2 day2	28日
ALL97 地固め⑦	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルピシン デキサメタゾン	1.3mg/m2 1000mg/m2 60mg/m2 10mg/m2	急速静注 180分 60分 内服	day1 day1 day1 day1-3	28日
ALL97 地固め⑧	シタラビン メルカプトプリン ミトキサントロン デキサメタゾン	200mg/m2 60mg/m2 8mg/m2 10mg/m2	24時間 内服 30分 内服	day1-4 day1-4 day2-3 day1-4	28日

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
Ph+ALL202 寛解導入	シクロホスファミド ダウノルビシン ピンクリスチン ブレドニゾロン イマチニブ	1200mg/m2 60mg/m2 1.3mg/m2 60mg/m2 600mg/body	180分 60分 急速静注 内服 内服	day1 day1-3 day1,8,15,21 day1-21 day8-63	28日
Ph+ ALL202 地固め①	メトトレキサート シタラビン	1g/m2 2000mg/m2	24時間 180分×2回	day1 day3-4	28日
Ph+ ALL202 地固め2	イマチニブ	600mg/body	内服		
Ph+ ALL202 維持強化	イマチニブ ピンクリスチン ブレドニゾロン	600mg/body 1.3mg/m2(Max2mg/body) 60mg/m2	内服 急速静注 内服	day1-5 day1-5 day1-5	14日
B-ALL97 Prephase (Mature)	シクロホスファミド ブレドニゾロン	200mg/m2 200mg/m2	120分	day1-5 day1-5	28日
B-ALL97 (Mature) <REGIMEN A > (C-1,C-3,C-5)	メトトレキサート シクロホスファミド ピンクリスチン ドキシソルビシン デキサメタゾン	500mg/m2 200mg/m2 1.3mg/m2(Max2mg/body) 50mg/m2 10mg/m2	24時間 120分 急速静注 60分 30分	day1 day1-5 day2 day5 day1-5	28日
B-ALL97 (Mature) <REGIMEN B > (C-2,C-4,C-6)	メトトレキサート シクロホスファミド ピンクリスチン エトボシド デキサメタゾン	500mg/m2 200mg/m2 1.3mg/m2(Max2mg/body) 100mg/m2 10mg/m2	24時間 120分 急速静注 180分 30分	day1 day.1-5 day.2 day.2-5 day.1-5	28日
LSG15療法	<プロトコールA> ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルビシン ブレドニゾロン <プロトコールB> ドキシソルビシン ラニムスチン ブレドニゾロン <プロトコールC> ビンデシン エトボシド カルボプラチン ブレドニゾロン	1mg/m2 350mg/m2 40mg/m2 40mg/m2 30mg/m2 60mg/m2 40mg/m2 2.4mgm2(Max3mg/body) 100mg/m2 250mg/m2 40mg/m2	急速静注 180分 60分 8時間 60分 30分 6時間 急速静注 180分 60分 12時間	day1 day8 day15 day15,16,17 day15 day15,16,17	28日
SMILE	メトトレキサート イホスファミド デキサメタゾン エトボシド ロイナーゼ	2g/m2 1500mg/m2 40mg/d 100mg/m2 6000IU/m2	6時間 2時間 3時間 3時間 2時間	day1 day2,3,4 day2,3,4 day2,3,4 day8,10,12,14,16,18,20	28日
HAM	シタラビン ミトキサントロン	2g/m2×2回 10mg/m2	3時間 30分	day1-3 day3-5	28日
Ph(-) ALL202-U <induction>	<induction> メトトレキサート/シタラビン/ブレドニゾロン ブレドニゾロン デキサメタゾン ブレドニゾロン ピンクリスチン ピラルビシン シクロホスファミド L-アスバラギナーゼ	15mg/40mg/20mg 60mg/m2 10mg/m2 40mg/m2 1.5mg/m2(Max2mg/body) 25mg/m2 1200mg/m2 6000IU/m2	髄注 1時間 1時間 内服 急速静注 1時間 1時間 120分	day1,8,11,15,22 day1-7 day8-14 day15-28 day8,15,22,29 day8,9 day10 day15,17,19,21,23,25,27,29	35日
Ph(-) ALL202-U <Consolidation>	<Consolidation> シクロホスファミド ピラルビシン シタラビン 6MP メトトレキサート/シタラビン/ブレドニゾロン	1200mg/m2 25mg/m2 75mg/m2 50mg/m2 15mg/40mg/20mg	1時間 1時間 1時間 内服 髄注	day1,8 day1,2 day1-6,8-13 day1-14 day1,8	28日

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
Ph(-) ALL202-U <Sanctuary>	<Sanctuary> メトトレキサート メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	3g/m2 15mg/40mg/20mg	24時間 髄注	day1.8 day8,11,15,22	14日
Ph(-) ALL202-U <Reinduction>	<Reinduction> ピンクリスチン ピラルビシン シクロホスファミド L-アスバラギナーゼ プレドニゾロン メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	1.5mg/m2(Max2mg/body) 25mg/m2 1200mg/m2 6000IU/m2 40mg /m2 15mg/40mg/20mg	急速静注 1時間 1時間 120分 内服 髄注	day1,8,15 day1,8 day1,8 day1,3,5,8,10,12 day1-14 day1	28日
ポテリジオ (単独)	モガムリズマブ	1mg/kg	120分	day1	7日
ポテリジオ (他剤併用)	モガムリズマブ	1mg/kg	120分	day1	14日
ロイスタチン	クラドリピン	0.09mg/kg		day1-7	
Ph(-) ALL202-O <induction>	<induction> シクロホスファミド ダウノルビシン ピンクリスチン プレドニゾロン L-アスバラギナーゼ	1200mg/m2 60mg/m2 1.3mg/m2(最大2mgまで) 60mg /m2 p.o. 3000IU/m2	3時間 1時間 急速静注 内服 2時間	day1 day1-3 day1,8,15,22 day1-21 day9,11,13,16,18,20	35日
Ph(-) ALL202-O <Consolidation ①>	<Consolidation ①> メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ シタラビン エトポシド デキサメタゾン	15mg/40mg/20mg 2000mg/m2 × 2 100mg/m2 40mg/body	髄注 3時間 1時間 30分	day1 day1,2,3 day1,2,3 day1,2,3	28日
Ph(-) ALL202-O <Consolidation ②>	<Consolidation ②> メトトレキサート ピンクリスチン 6MP メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	3g/m2 1.3mg/m2(最大2mgまで) 25mg/m2 15mg/40mg/20mg	12時間 急速静注 内服 髄注	day1,15 day1,8,15 day1-21 day1,15	28日
Ph(-) ALL202-O <Consolidation ③>	<Consolidation ③> ピンクリスチン ドキシソルビシン デキサメタゾン シクロホスファミド 6MP シタラビン メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	1.3mg/m2(最大2mgまで) 30mg/m2 40mg/body 1000mg/m2 60mg/m2 75mg/m2 15mg/40mg/20mg	急速静注 1時間 内服 3時間 内服 1時間 髄注	day1,8,15 day1,8,15 day1-8,15-22 day29 day29-42 day29-33,36-40 day1,29	56日
Ph(-) ALL202-O <Maintenance>	<Maintenance> ピンクリスチン プレドニゾロン メトトレキサート 6MP	1.3mg/m2(最大2mgまで) 60mg /m2 20mg/m2 60mg/m2	急速静注 内服 内服 内服	day1,8,15 day1-5 day1,8,15,22 day1-28	
Ph(+) ALL208 <Induction>	<Induction> シクロホスファミド ダウノルビシン ピンクリスチン プレドニゾロン イマチニブ メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	1200mg/m2 60mg/m2 1.3mg/m2(最大2mgまで) 60mg /m2 600mg/body 15mg/40mg/20mg	3時間 1時間 急速静注 内服 内服 髄注	day1 day1-3 day1,8,15,22 day1-21 day8-42 day29	42日
Ph(+) ALL208 <Consolidation ①>	<Consolidation ①> メトトレキサート シタラビン mPSL d.i.v. イマチニブ メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	1g/m2 2000mg/m2 × 2 50mg/body × 2 600mg/body 15mg/40mg/20mg	12時間 3時間 30分 内服 髄注	day1 day2,3 day1-3 day4-21 day1	28日
Ph(+) ALL208 <Consolidation ②>	<Consolidation ②> シクロホスファミド ダウノルビシン ピンクリスチン プレドニゾロン イマチニブ メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	1200mg/m2 60mg/m2 1.3mg/m2(最大2mgまで) 60mg /m2 600mg/body 15mg/40mg/20mg	3時間 1時間 急速静注 内服 内服 髄注	day1 day1 day1 day1-7 day2-21 day1	28日
Ph(+) ALL208 <Maintenance>	<Maintenance> ピンクリスチン プレドニゾロン イマチニブ	1.3mg/m2(最大2mgまで) 60mg /m2 600mg/body	急速静注 内服 内服	day1 day1-5 day1-28	28日