

## 食道癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
FP+radiation	シスプラチン フルオロウラシル RT	70mg/m2 700mg/m2 2Gy	120分 24時間	day 1、29 day1-4、29-32 30回	
FP	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m2 800mg/m2	120分 24時間	day 1 day 1-5	28日
FP(1000/75)+RT	フルオロウラシル シスプラチン RT	1000mg/m2 75mg/m2 2Gy	24時間 120分	day 1-4 day 1 25回	28日
低用量FP +radiation	シスプラチン フルオロウラシル RT	4mg/m2 200mg/m2 2Gy	60分 24時間	day 1-5 day 1-5 30回	42日
DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m2 70mg/m2 700mg/m2	90分 120分 24時間	day1 day1 day1-5	21日
ネダプラチン+5FU	ネダプラチン フルオロウラシル	90mg/m2 800mg/m2	90分 24時間	day 1 day 1-5	28日
DTX	ドセタキセル	70mg/m2	60分	day1	21-28日
wPTX	パクリタキセル	100mg/m2	60分	day1.8.15.22.29.36	49日
mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナートカルシウム フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	120分 120分 急速静注 46時間	day 1 day 1 day 1 day1-2	14日
ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日
ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日