

## 尿路上皮癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
GC(4週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	28日	高
	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	120分	day2		
GC(3週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8	21日	高
	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	120分	day2		
カルボプラチン+ゲムシタビン(4週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	28日	高
	カルボプラチン	AUC 4	60分	day2		
カルボプラチン+ゲムシタビン(3週毎)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8	21日	高
	カルボプラチン	AUC 4	60分	day2		
ゲムシタビン+DTX	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8	21日	小
	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	60分	day8		
ペムブロリズマブ(3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日	最小
ペムブロリズマブ(6週毎)	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日	最小
テラルピシン膀胱注入	テラルピシン	20mg 膀胱内注入	1-2時間1/週	day1	8回	最小
テラルピシン膀胱注入	テラルピシン	30mg 膀胱内注入	1-2時間	術後24時間以内	1回のみ	最小
パドセフ	パドセフ	1.25mg/kg	30分	Day1,8,15	28日	最小

## 腎癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小
ペムブロリズマブ+アキシチニブ	ペムブロリズマブ	240mg/body	30分	day1	21日	最小
	アキシチニブ	10mg/day	内服	内服		
イピリムマブ+ニボルマブ	イピリムマブ	1mg/kg	30分	day1	21日	最小
	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1		
ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小

## 前立腺がん

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	60分	day1	21日	小
カバジタキセル	カバジタキセル	25mg/m <sup>2</sup>	60分	day1	21日	小

## 精巣腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
BEP	シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	120分	day1-5	21~28日 4コース	高
	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	120分	day1-5		
	ブレオマイシン	30mg/body	30分	day1,8,15		