

食道癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
FP+radiation	シスプラチン フルオロウラシル RT	70mg/m2 700mg/m2 2Gy	120分 24時間	day 1、29 day1-4、29-32 30回		高
FP	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m2 800mg/m2	120分 24時間	day 1 day 1-5	28日	高
FP(1000/75)+RT	フルオロウラシル シスプラチン RT	1000mg/m2 75mg/m2 2Gy	24時間 120分	day 1-4 day 1 25回	28日	高
低用量FP +radiation	シスプラチン フルオロウラシル RT	4mg/m2 200mg/m2 2Gy	60分 24時間	day 1-5 day 1-5 30回	42日	小
DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m2 70mg/m2 700mg/m2	90分 120分 24時間	day1 day1 day1-5	21日	高
ネダプラチン+5FU	ネダプラチン フルオロウラシル	90mg/m2 800mg/m2	90分 24時間	day 1 day 1-5	28日	中
DTX	ドセタキセル	70mg/m2	60分	day1	21-28日	小
wPTX	パクリタキセル	100mg/m2	60分	day1.8.15.22.29.36	49日	小
mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナートカルシウム フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	120分 120分 急速静注 46時間	day 1 day 1 day 1 day1-2	14日	中
ニボルマブ(2週毎) 術後補助療法	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小
ニボルマブ(4週毎) 術後補助療法	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小
ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小
ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小
ペムブロリズマブ+ FP	ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body 80mg/m2 800mg/m2	30分 120分 24時間	day1 day 1 day 1-5	21日	高
ペムブロリズマブ (3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日	最小
ペムブロリズマブ (6週毎)	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日	最小
ニボルマブ(240)+FP	ニボルマブ シスプラチン フルオロウラシル	240mg/body 80mg/m2 800mg/m2	30分 120分 24時間	day1、15 day 1 day 1-5	4週毎	高
ニボルマブ(480)+FP	ニボルマブ シスプラチン フルオロウラシル	480mg/body 80mg/m2 800mg/m2	30分 120分 24時間	day1 day 1 day 1-5	4週毎	高
Nivo(240)+IPI	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1,15,29 day1	42日	最小
Nivo(360)+IPI	ニボルマブ	360mg/body	30分	day1,21	42日	最小

イピリムマブ

1mg/kg

30分

day1