

胆道癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐 リスク
GEM+CDDP	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m2 25mg/m2	30分 60分	day1,8 day1,8	21日	中
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	30分	day1,8,15	28日	小
GCS	S-1 ゲムシタビン シスプラチン	80mg/m2 1000mg/m2 25mg/m2	内服 30分 60分	day1-7 day1 day1	14日	中
S1+GEM	ゲムシタビン S-1	1000mg/m2 60mg/m2	30分 内服	day1,8 day1-14	21日	小
デュルバルマブ+ GEM+CDDP	デュルバルマブ ゲムシタビン シスプラチン	1500mg/body 1000mg/m2 25mg/m2	60分 30分 60分	day1 day1,8 day1,8	21日 最大8コース	中
	<維持療法> デュルバルマブ	1500mg/body	60分	day1	28日	最小

膵臓癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐 リスク
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	30分	day1,8,15	28日	小
S-1+GEM	ゲムシタビン S-1	1000mg/m2 65mg/m2	30分 内服	day1,8 day1-14	21日	小
nab-PTX+GEM	パクリタキセル(alb) ゲムシタビン	125mg/m2 1000mg/m2	30分 30分	day1,8,15 day1,8,15	28日	小
FOLFIRINOX	レボホリナート オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m2 85mg/m2 180mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	120分 120分 90分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-2	14日	高
オニパイト+5FU+I-LV	リボゾームイリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	70mg/m2 200mg/m2 2400mg/m2	90分 120分 46時間	day1 day1 day1-2	14日	中

肝臓癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐 リスク
アイエーコール	シスプラチン	100mg/body	動注	day1	—	最小
EPI	エピルビシン	40mg/body	動注	day1	—	最小
ラムシルマブ	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	day1	14日	最小
Atezo+Bev	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg/kg 15mg/kg	30分 (初回60分)	day1,15	21日	最小
エピルビシン(DEB-TACE)	エピルビシン	30mg/body	動注	day1	—	最小
アイエーコール(DEB-TACE)	シスプラチン	50mg/body	動注	day1	—	最小
トレメリマブ+ デュルマルマブ	トレメリマブ デュルバルマブ	BW>30kg 300mg/body BW≤30kg 4mg/kg BW>30kg 1500mg/body BW≤30kg 20mg/kg	60分 60分	Day1(1クール目のみ) Day1	28日	最小

神経内分泌腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐 リスク
STZ	ストレプトゾシン	1000mg/m2 1250mg/m2 1500mg/m2	30分 30分 30分	day1 day1 day1	7日 7日 7日	中 中 中