

悪性骨・軟部腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
IFO+ADR	イホマイド ドキシソルピシン	1.5-3.0g/m ² 20-30mg/m ²	120分 60分	day1-3 day1-3	28日	高
wPTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	day1,8,15	28日	小
ADR	ドキシソルピシン	75mg/m ²	急速静注	day1	21日	中
エリブリン	エリブリン	1.4mg/m ²	急速静注	day1、8	21日	小
トラベクテジン	トラベクテジン	1.2mg/m ²	24時間	day1-4	21日	中

悪性黒色腫

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小
イピリムマブ	イピリムマブ	3mg/kg	90分	day1	21日	最小
ペムブロリズマブ(3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日	最小
IPI+Nivo	イピリムマブ ニボルマブ	3mg/kg 80mg/body	90分 30分	day1 day1	21日	最小
ペムブロリズマブ(6週毎)	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日	最小
ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小

MSI-Higを有する固形腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ペムブロリズマブ(3週間)	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日	最小
ペムブロリズマブ(6週間)	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日	最小

原発不明癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小
ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小