白血病

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
AML89　寛解導入	ダウノルビシン シタラビン メルカプトプリン水和物	40mg/m2 80mg/m2 70mg/m2	60分 24時間 内服	day1-4 day1-7 day1-10	28日
AML89 地固め①	ダウノルビシン シタラビン メルカプトプリン水和物	50mg/m2 80mg/m2 70mg/m2	30分 24時間 内服	day1-3 day1-7 day1-7	28日
AML89 地固め②	ミトキサントロン シタラビン	7mg/m2 200mg/m2	60分 24時間	day1-3 day1-5	28日
AML89 地固め③	エトポシド シタラビン ビンデシン	100mg/m2 80mg/m2 2mg/m2	180分 24時間 30分	day1-5 day1-7 day10.12	28日
AML95 寛解導入	イダルビシン シタラビン	12mg/m2 100mg/m2	30分 24時間	day1-3 day1-7	28日
AML95 地固め①	ミトキサントロン シタラビン	7mg/m2 200mg/m2	30分 24時間	day1-3 day1-5	28日
AML95 地固め②	エノシタビン ダウノルビシン エトポシド メルカプトプリン水和物	200mg/m2 50mg/m2 100mg/m2 70mg/m2	180分 30分 180分 内服	day1-7 day1-3 day1-5 day1-7	28日
AML95 地固め③	エノシタビン アクラシノン	200mg/m2 14mg/m2	180分 30分	day1-7 day1-7	28日
AML95 維持強化①	エノシタビン ダウノルビシン メルカプトプリン水和物	170mg/m2 30mg/m2 70mg/m2	120分 30分 内服	day1-6 day1.4 day1-6	28日
AML95 維持強化②	エノシタビン ミトキサントロン	170mg/m2 5mg/m2	120分 30分	day1-6 day1-2	28日
AML95 維持強化③	エノシタビン エトポシド ビンデシン	170mg/m2 80mg/m2 2mg/m2　(max3mg/body)	120分 180分 30分	day1-6 day1.3.5 day1.8	28日
AML95 維持強化④	エノシタビン アクラシノン	170mg/m2 14mg/m2	120分 30分	day1-6 day1-4	28日
AML95 維持強化⑤	エノシタビン ダウノルビシン メルカプトプリン水和物	170mg/m2 30mg/m2 70mg/m2	120分 30分 内服	day1-6 day1.4 day1-6	28日
AML95 維持強化⑥	エノシタビン エトポシド ビンデシン	170mg/m2 80mg/m2 2mg/m2	120分 180分 30分	day1-6 day1,3,5 day1.8	28日
APL97 寛解導入 (WBC≧10000/μl)	イダルビシン シタラビン トレチノイン	12mg/m2 100mg/m2 45mg/m2	30分 24時間 内服	day1-3 day1-5 最大60日	28日
APL97 寛解導入 (3000≦WBC≦10000/μl)	イダルビシン シタラビン トレチノイン	12mg/m2 80mg/m2 45mg/m2	30分 24時間 内服	day1-2 day1-5 最大60日	28日
APL97 地固め①	ミトキサントロン シタラビン	7mg/m2 200mg/m2	30分 24時間	day1-3 day1-5	28日
APL97 地固め②	ダウノルビシン シタラビン エトポシド	50mg/m2 140mg/m2 100mg/m2	30分 24時間 120分	day1-3 day1-5 day1-5	28日
APL97 地固め③	イダルビシン シタラビン	12mg/m2 140mg/m2	30分 24時間	day1-3 day1-5	28日
APL97 維持強化	トレチノイン メルカプトプリン水和物 メトトレキサート	45mg/m2 90mg/m2 20mg/body	内服 内服 内服	day1-15 day1-15 day1.15	28日
AML201 寛解導入 IDA	イダルビシン シタラビン	12mg/m2 100mg/m2	30分 24時間	day1-3 day1-7	28日
AML201 寛解導入 DNR	ダウノルビシン シタラビン	50mg/m2 100mg/m2	30分 24時間	day1-5 day1-7	28日
AML201 地固め①	ミトキサントロン シタラビン	7mg/m2 200mg/m2	30分 24時間	day1-3 day1-5	28日
AML201 地固め②	ダウノルビシン シタラビン	50mg/m2 200mg/m2	30分 24時間	day1-3 day1-5	28日
AML201 地固め③	アクラシノン シタラビン	20mg/m2 200mg/m2	30分 24時間	day1-5 day1-5	28日

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
AML201 地固め④	エトポシド	100mg/m2	60分	day1-5	28日
	シタラビン	200mg/m2	24時間	day1-5	
	ビンクリスチン	0.8mg/m2	30分	day8	
	ビンデシン	2mg/m2	30分	day10	
AML201 HiDAC	シタラビン	2000mg/m2×2回	180分	day1-5	28日
APL205R寛解導入 トリセノックス	三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	120分	day1-25	28日
APL205R寛解導入 IDA追加用	イダルビシン	12mg/m2	30分	day1-2	28日
APL205R 地固め①	三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	120分	day1-25	28日
APL205R 地固め②	三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	120分	day1-25	28日
APL205R 地固め③ PBSCH	シタラビン	4000mg/m2	180分×2回	day1-4	-
	G-CSF	10μg/kg	皮下	day6～採取日まで	
APL205R PBSCT	ブスルファン	1mg/kg(60歳以上0.7mg/kg)	内服	day-6～-4	-
	メルファラン	70mg/m2	60分	day-3～-2	
	幹細胞輸注			day0	
	G-CSF	5μg/kg	皮下	day3～	
MEC	シタラビン	100mg/m2	24時間	day1-7	28日
	エトポシド	80mg/m2	120分	day1-5	
	ミトキサントロン	5mg/m2	30分	day1-3	
HAM	シタラビン	2g/m2×2回	180分×2回	d1-3	28日
	ミトキサントロン	10mg/m2	30分	day3-5	
大量AraC療法	シタラビン	2g/m2×2回	180分×2回	day1-4	28日
ADVP	シクロホスファミド	600mg/m2	180分	day1.(15).(22)	28日
	ドキソルビシン	20mg/m2	60分	day1.2.8.15.(22)	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day1.8.15.(22).(29)	
	L-アスパラギナーゼ	6000UI/m2	120分	day22-31	
	プレドニゾロン	40mg/m2	12時間	day1-29 then taper	
ALL97 寛解導入	〈寛解導入〉				28日
	シクロホスファミド	1200mg/m2	180分	day1	
	ダウノルビシン	45mg/m2	60分	day1-3	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day1.8.15.22	
	L-アスパラギナーゼ	3000UI/m2	120分	day9.11.13.16.18.20	
	プレドニゾロン	60mg/body	6時間	day1-14 then taper	
ALL97 地固め①	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day1	28日
	シクロホスファミド	1000mg/m2	180分	day1	
	ドキソルビシン	60mg/m2	24時間	day1	
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day1-3	
ALL97 地固め②	メトトレキサート	500mg/m2	24時間	day1	28日
ALL97 地固め③	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day1	28日
	シクロホスファミド	1000mg/m2	180分	day1	
	ドキソルビシン	60mg/m2	24時間	day1	
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day1-3	
ALL97 地固め④	エトポシド	100mg/m2	60分	day1-4	28日
	シタラビン	200mg/m2	24時間	day1-4	
	メルカプトプリン	60mg/m2	内服	day1-4	
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day1-4	
ALL97 地固め⑤	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day1	28日
	シクロホスファミド	1000mg/m2	180分	day1	
	ドキソルビシン	60mg/m2	24時間	day1	
	デキサメタゾン	10mg/m2	内服	day1-3	
ALL97 地固め⑥	メトトレキサート	500mg/m2	24時間	day1	28日
	ドキソルビシン	45mg/m2	60分	day2	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day2	
ALL97 地固め⑦	ビンクリスチン	1.3mg/m2	急速静注	day1	28日
	シクロホスファミド	1000mg/m2	180分	day1	
	ドキソルビシン	60mg/m2	60分	day1	
	デキサメタゾン	10mg/m2	内服	day1-3	
ALL97 地固め⑧	シタラビン	200mg/m2	24時間	day1-4	28日
	メルカプトプリン	60mg/m2	内服	day1-4	
	ミトキサントロン	8mg/m2	30分	day2-3	
	デキサメタゾン	10mg/m2	内服	day1-4	
Ph+ALL202 寛解導入	シクロホスファミド	1200mg/m2	180分	day1	28日
	ダウノルビシン	60mg/m2	60分	day1-3	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2	急速静注	day1.8.15.21	
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day1-21	
	イマチニブ	600mg/body	内服	day8-63	

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
Ph+ ALL202　地固め①	メトトレキサート	1g/m2	24時間	day1	28日
	シタラビン	2000mg/m2	180分×2回	day3-4	
Ph+ ALL202　地固め2	イマチニブ	600mg/body	内服		
Ph+ ALL202　維持強化	イマチニブ	600mg/body	内服	day1-5	14日
	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day1-5	
	プレドニゾロン	60mg/m2	内服	day1-5	
B-ALL97　Prephase					28日
(Mature)	シクロホスファミド	200mg/m2	120分	day1-5	
	プレドニゾロン	200mg/m2		day1-5	
B-ALL97					28日
(Mature)	メトトレキサート	500mg/m2	24時間	day1	
<REGIMEN　A　>(C-1,C-3,C-5)	シクロホスファミド	200mg/m2	120分	day1-5	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day2	
	ドキソルビシン	50mg/m2	60分	day5	
	デキサメサゾン	10mg/m2	30分	day1-5	
B-ALL97					28日
(Mature)	メトトレキサート	500mg/m2	24時間	day1	
<REGIMEN　B　>(C-2,C-4,C-6)	シクロホスファミド	200mg/m2	120分	day.1-5	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day.2	
	エトポシド	100mg/m2	180分	day.2-5	
	デキサメタゾン	10mg/m2	30分	day.1-5	
LSG15療法	＜プロトコールA＞			day1	28日
	ビンクリスチン	1mg/m2	急速静注		
	シクロホスファミド	350mg/m2	180分		
	ドキソルビシン	40mg/m2	60分		
	プレドニゾロン	40mg/m2	8時間		
	＜プロトコールB＞				
	ドキソルビシン	30mg/m2	60分	day8	
	ラニムスチン	60mg/m2	30分		
	プレドニゾロン	40mg/m2	6時間		
	＜プロトコールC＞				
	ビンデシン	2.4mgm2(Max3mg/body)	急速静注	day15	
	エトポシド	100mg/m2	180分	day15,16,17	
	カルボプラチン	250mg/m2	60分	day15	
	プレドニゾロン	40mg/m2	12時間	day15,16,17	
SMILE	メトトレキサート	2g/m2	6時間	day1	28日
	イホスファミド	1500mg/m2	2時間	day2.3.4	
	デキサメタゾン	40mg/d	3時間	day2.3.4	
	エトポシド	100mg/m2	3時間	day2.3.4	
	ロイナーゼ	6000IU/m2	2時間	day8.10.12.14.16.18.20	
HAM	シタラビン	2g/m2×2回	3時間	day1-3	28日
	ミトキサントロン	10mg/m2	30分	day3-5	
Ph(-) ALL202-U	＜induction＞				35日
＜induction＞	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1,8,11,15,22	
	プレドニゾロン	60mg /m2	1時間	day1-7	
	デキサメタゾン	10mg/m2	1時間	day8-14	
	プレドニゾロン	40mg /m2	内服	day15-28	
	ビンクリスチン	1.5mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day8,15,22,29	
	ピラルビシン	25mg/m2	1時間	day8,9	
	シクロホスファミド	1200mg/m2	1時間	day10	
	L-アスパラギナーゼ	6000UI/m2	120分	day15,17,19,21,23,25,27,29	
Ph(-) ALL202-U	＜Consolidation＞				28日
＜Consolidation＞	シクロホスファミド	1200mg/m2	1時間	day1.8	
	ピラルビシン	25mg/m2	1時間	day1.2	
	シタラビン	75mg/m2	1時間	day1-6,8-13	
	6MP	50mg／m2	内服	day1-14	
	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1,8	
Ph(-) ALL202-U	＜Sanctuary＞				14日
＜Sanctuary＞	メトトレキサート	3g/m2	24時間	day1.8	
	メソトレキセート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day8,11,15,22	

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
Ph(-) ALL202-U	＜Reinduction＞				28日
＜Reinduction＞	ビンクリスチン	1.5mg/m2(Max2mg/body)	急速静注	day1,8,15	
	ピラルビシン	25mg/m2	1時間	day1,8	
	シクロホスファミド	1200mg/m2	1時間	day1,8	
	L-アスパラギナーゼ	6000UI/m2	120分	day1,3,5,8,10,12	
	プレドニゾロン	40mg /m2	内服	day1-14	
	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1	
ポテリジオ （単独）	モガムリズマブ	1mg/kg	120分	day1	7日
ポテリジオ （他剤併用）	モガムリズマブ	1mg/kg	120分	day1	14日
ロイスタチン	クラドリビン	0.09mg/kg		day1-7	
Ph(-) ALL202-O	＜induction＞				35日
＜induction＞	シクロホスファミド	1200mg/m2	3時間	day1	
	ダウノルビシン	60mg/m2	1時間	day1-3	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2（最大2mgまで）	急速静注	day1,8,15,22	
	プレドニゾロン	60mg /m2 p.o.	内服	day1-21	
	L-アスパラギナーゼ	3000IU/m2	2時間	day9.11.13.16.18.20	
Ph(-) ALL202-O	<Consolidation ①>				28日
<Consolidation ①>	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1	
	シタラビン	2000mg/m2×2	3時間	day1,2,3	
	エトポシド	100mg/m2	1時間	day1,2,3	
	デキサメタゾン	40mg/body	30分	day1,2,3	
Ph(-) ALL202-O	<Consolidation ②>				28日
<Consolidation ②>	メトトレキサート	3g/m2	12時間	day1,15	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2（最大2mgまで）	急速静注	day1,8,15	
	6MP	25mg/m2	内服	day1-21	
	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1,15	
Ph(-) ALL202-O	<Consolidation ③>				56日
<Consolidation ③>	ビンクリスチン	1.3mg/m2（最大2mgまで）	急速静注	day1,8,15	
	ドキソルビシン	30mg/m2	1時間	day1,8,15	
	デキサメタゾン	40mg/body	内服	day1-8,15-22	
	シクロホスファミド	1000mg/m2	3時間	day29	
	6MP	60mg/m2	内服	day29-42	
	シタラビン	75mg/m2	1時間	day29-33,36-40	
	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1,29	
Ph(-) ALL202-O	<Maintenance>				
<Maintenance>	ビンクリスチン	1.3mg/m2（最大2mgまで）	急速静注	day1,8,15	
	プレドニゾロン	60mg /m2	内服	day1-5	
	メトトレキサート	20mg/m2	内服	day1,8,15,22	
	6MP	60mg/m2	内服	day1-28	
Ph(+) ALL208	<Induction>				42日
<Induction>	シクロホスファミド	1200mg/m2	3時間	day1	
	ダウノルビシン	60mg/m2	1時間	day1-3	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2（最大2mgまで）	急速静注	day1,8,15,22	
	プレドニゾロン	60mg /m2	内服	day1-21	
	イマチニブ	600mg/body	内服	day8-42	
	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day29	
Ph(+) ALL208	<Consolidation ①>				28日
<Consolidation ①>	メトトレキサート	1g/m2	12時間	day1	
	シタラビン	2000mg/m2×2	3時間	day2,3	
	mPSL d.i.v.	50mg/body×2	30分	day1-3	
	イマチニブ	600mg/body	内服	day4-21	
	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1	
Ph(+) ALL208	<Consolidation ②>				28日
<Consolidation ②>	シクロホスファミド	1200mg/m2	3時間	day1	
	ダウノルビシン	60mg/m2	1時間	day1	
	ビンクリスチン	1.3mg/m2（最大2mgまで）	急速静注	day1	
	プレドニゾロン	60mg /m2	内服	day1-7	
	イマチニブ	600mg/body	内服	day2-21	
	メトトレキサート/シタラビン/プレドニゾロ	15mg/40mg/20mg	髄注	day1	
Ph(+) ALL208	<Maintenance>				28日
<Maintenance>	ビンクリスチン	1.3mg/m2（最大2mgまで）	急速静注	day1	
	プレドニゾロン	60mg /m2	内服	day1-5	
	イマチニブ	600mg/body	内服	day1-28	
ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ＋アザシチジン（皮下）	ベネクレクスタ	100→200→400mg/day 以降400mg/day	内服	Day1-28	28日
	アザシチジン	75mg/m2	皮下	Day1-7	
ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ＋アザシチジン（点滴）	ベネクレクスタ	100→200→400mg/day 以降400mg/day	内服	Day1-28	28日
	アザシチジン	75mg/m2	点滴	Day1-7	
ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ	ベネクレクスタ	100→200→400→600mg/day 以降600mg/day	内服	Day1-28	28日
＋低用量ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	シタラビン	20mg/m2	皮下	Day1-10	

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ベスポンサ	**1サイクル目** ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞ・ｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	 0.8mg/m2 0.5mg/m2	 点滴 点滴	 Day1 Day8、15	 21日
	寛解が得られなかった場合 **2-6サイクル目** ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞ・ｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	 0.8mg/m2 0.5mg/m2	 点滴 点滴	 Day1 Day8,15	 28日
	寛解が得られた場合 **2-6サイクル目** ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞ・ｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	 0.5mg/m2	 点滴	 Day1、8, 15	 28日
ビーリンサイト（体重45kg以上）	**1サイクル目** ブリナツモマブ	 9μg/day 28μg/day	 点滴 点滴	 Day1-7 Day8-28	 42日
	2-5サイクル目 ブリナツモマブ	 28μg/day	 点滴	 Day1-28	 42日
	6-9サイクル目 ブリナツモマブ	 28μg/day	 点滴	 Day1-28	 84日