

市立伊丹病院薬剤科 約束処方一覧

《アセモトール 100mL》

ミョウバン（硫酸アルミニウムカリウム）	1g
ホウ砂	2g
亜鉛華（酸化亜鉛）	7g
タルク	7g
サリチル酸	0.5g
80%エタノール（消毒用エタノール）	10mL
グリセリン	4mL
ハッカ油	0.1mL
加水全量	100mL

＜調製法＞

- ① 精製水適量（50mL 程度）を入れた透明外用容器にミョウバンを加え、溶解する。
- ② ①にホウ砂、酸化亜鉛、タルクを加え、溶解する。
- ③ ビーカー（②とは別の容器）にエタノールを入れ、そこへサリチル酸を加えて溶解する。
- ④ ③にグリセリンとハッカ油を加える。
- ⑤ ②の透明外用容器に④を加えて、よく攪拌する。

＜使用方法＞

ご使用前によく振ってください。
あせも等におぬりください。

≪【内服】ハリゾン内用液（1 日分）≫

ハリゾンシロップ 100mg/mL

3mL

<調製法>

- ①ハリゾン内用液 1 日分 3mL に対し、精製水 12mL を加え、全量が 15mL になるように希釈する。（5 倍希釈）

<使用方法>

冷蔵庫に保存してください。

よく振ってください。

口腔内に含ませ、広く行き渡らせてください。

約 15～30 秒たちましたら、そのまま飲み込んでください。

≪【含嗽】ハリゾン含嗽液（1 日分）≫

ハリゾンシロップ 100mg/mL

4mL

<調製法>

- ①ハリゾン内用液 1 日分 4mL に対し、精製水 36mL を加え、全量が 40mL になるように希釈する。（10 倍希釈）

<使用方法>

冷蔵庫に保存してください。

よく振ってください。

口腔内に含ませ、広く行き渡らせてください。

約 15～30 秒たちましたら、吐き出してください。

《10 倍希釈ポピラール液》

ポピラール消毒液 10%	1mL
精製水	9mL
加水全量	10mL

＜調製法＞

- ① ポピラール消毒液 10%1mL に対し、精製水 9mL を加え、全量が 10mL になるように希釈する。(10 倍希釈)

＜使用方法＞

飲まないでください。

使用期限は未開封で処方日から 2 ヶ月です。

開封後 1 ヶ月以内にお使いください。

《キシロカイン・ハチアズレ含嗽液（5 日分）》

キシロカイン液「4%」	10mL
含嗽用ハチアズレ顆粒（2g/包）	5 包
精製水	490mL
加水全量	500mL

＜調製法＞

- ① 精製水適量を入れた褐色容器に含嗽用ハチアズレ顆粒を入れ溶かし込む
- ② キシロカイン液「4%」を加え、全量が 500mL になるように精製水を加える。

＜使用方法＞

飲まないでください。

口の中に薬 30 秒含んだ後にはき出して下さい。

使用後は、冷蔵庫で保管し、5 日間で使い切ってください。

キシロカイン液「4%」の確保が困難な場合の代替処方

《キシロカインビスカス・ハチアズレ含嗽液（5 日分）》

キシロカインビスカス 2%	20mL
含嗽用ハチアズレ顆粒（2g/包）	5 包
精製水	480mL
加水全量	500mL

＜調製法＞

- ① 精製水適量を入れた褐色容器に含嗽用ハチアズレ顆粒を入れ溶かし込む
- ② キシロカインビスカス 2%を加え、全量が 500mL になるように精製水を加える。

＜使用方法＞

飲まないでください。

口の中に薬 30 秒含んだ後にはき出して下さい。

使用後は、冷蔵庫で保管し、5 日間で使い切ってください。

2024 年 5 月 29 日作成

2025 年 5 月 12 日改訂