尿路上皮癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
GC(4週毎)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1,8,15	28日	高
	シスプラチン	70mg/m ²	120分	day2		
GC(3週毎)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1,8	21日	高
	シスプラチン	70mg/m ²	120分	day2		
カルボプラチン+ゲムシタピン(4週毎)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1,8,15	28日	高
	カルボプラチン	AUC 4	60分	day2		
カルボプラチン+ゲムシタピン(3週毎)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1,8	21日	高
	カルボプラチン	AUC 4	60分	day2		
ゲムシタピン+DTX	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1,8	21日	小
	ドセタキセル	70mg/m ²	60分	day8		
ペムプロリズマブ(3週毎)	ペムプロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日	最小
ペムプロリズマブ(6週毎)	ペムプロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日	最小
テラルピシン膀胱注入	テラルピシン	20mg	膀胱内注入	1-2時間/週	day1	8回
テラルピシン膀胱注入	テラルピシン	30mg	膀胱内注入	1-2時間	術後24時間以内	1回のみ
パドセフ	パドセフ	1.25mg/kg	30分	Day1,8,15	28日	最小
アベルマブ	アベルマブ	10mg/kg	60分	Day1	14日	最小
ニボルマブ(2週毎) 術後補助療法	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日 最長1年間	最小
ニボルマブ(4週毎) 術後補助療法	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日 最長1年間	最小
パドセフ+ペンプロリズマブ	パドセフ	1.25mg/kg	30分	day1	21日	小
	ペムプロリズマブ	200mg/body	30分			
ニボルマブ+GC	ニボルマブ	360mg/body	30分	day1	21日 6クール	高
	シスプラチン	70mg/m ²	60分	day1		
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1, 8		
ニボルマブ+Gカルボ	ニボルマブ	360mg/body	30分	day1	21日 5クール	高
	カルボプラチン	AUC4.5	60分	day1		
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1, 8		

腎癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小
ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小
ペムプロリズマブ+アキシチニブ	ペムプロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日	最小
	アキシチニブ	10mg/day	内服	内服		
イビリムマブ+ニボルマブ	イビリムマブ	1mg/kg	30分	day1	21日	最小
	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1		
ペムプロリズマブ(3週毎) 術後補助療法	ペムプロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日 12ヶ月	最小
ペムプロリズマブ(6週毎) 術後補助療法	ペムプロリズマブ	400mg/body	30分	day1	42日 12ヶ月	最小
ペムプロリズマブ+レンパチニブ	ペムプロリズマブ	200mg/body	30分	day1	21日	最小
	レンパチニブ	20mg/day	内服	毎日		
ペムプロリズマブ+レンパチニブ	ペムプロリズマブ	200mg/body	30分	day1	42日	最小
	レンパチニブ	20mg/day	内服	毎日		
ニボルマブ+カボザンチニブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小
	カボザンチニブ	40mg/day	内服	毎日		
ニボルマブ+カボザンチニブ	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小
	カボザンチニブ	40mg/day	内服	毎日		
アベルマブ+アキシチニブ	アベルマブ	10mg/kg	60分	day1	14日	最小
	アキシチニブ	10mg/day	内服	毎日		

前立腺がん

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m ²	60分	day1	21日	小
カバジタキセル	カバジタキセル	25mg/m ²	60分	day1	21日	小
ニューベクオ+ドセタキセル+4AD	ダロルタミド	1200mg/body	内服	毎日	21日	小
	ドセタキセル*	75mg/m ²	60分	Day1		
	ADT			* ニュベクオ開始6週間内に開始し最大6コー		

精巣腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
BEP	シスプラチン	20mg/m ²	120分	day1-5	21~28日 4コース	高
	エトポシド	100mg/m ²	120分	day1-5		
	ブレオマイシン	30mg/body	30分	day1,8,15		